

## Surface de classement des grains



Fusarié



Germes endommagés




Germés



Percés par les insectes



Pelés / Cassés



À deux rangs / À six rangs

Facteurs déterminants des grades d'orge	Limites minimales		Limites maximales				
	Poids spécifique minimum par boisseau Winchester (livres)	Grains sains (pourcentage)	Grains endommagés (pourcentage)	Grains échauffés (pourcentage)	Matières étrangères (pourcentage)	Grains cassés (pourcentage)	Grains minces (pourcentage)
<b>US N° 1</b>	<b>47,0</b>	<b>97,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>
<b>US N° 2</b>	<b>45,0</b>	<b>94,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>15,0</b>
<b>US N° 3</b>	<b>43,0</b>	<b>90,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>25,0</b>
<b>US N° 4</b>	<b>40,0</b>	<b>85,0</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>18,0</b>	<b>35,0</b>
<b>US N° 5</b>	<b>36,0</b>	<b>75,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>28,0</b>	<b>75,0</b>

\*Les grains légèrement gelés, légèrement échauffés et légèrement moisissés sont des facteurs exclusifs à l'orge brassicole. Ils **ne sont pas** considérés comme des grains endommagés et ne doivent pas être soustraits du pourcentage de grains sains.

Dans l'orge brassicole, les grains germés, échauffés et gelés **sont** considérés comme des grains endommagés et doivent être soustraits du pourcentage de grains sains.

L'orge de classe brassicole peut contenir un maximum de 1,9 % de grains légèrement gelés, 0,4 % de grains gelés, 0,2 % de grains légèrement échauffés et 0,1 % de grains échauffés. La sous-classe d'orge brassicole à deux rangs peut contenir un maximum de 1,9 % de grains légèrement moisissés et 0,4 % de grains moisissés. L'orge brassicole qui dépasse ces limites maximales n'est pas admissible à cette fin.



Gelés\*



Échauffés\*



Mildiousés\*



Légèrement gelé\*



Légèrement moissi\*



Légèrement échauffés\*



## Surface de classement des grains



Moisissure pénicillium



Plumules pourpres  
(pas endommagés)




Moisissure de la surface  
(dépérissement)



Pourriture de l'épi



Moisissure de la surface



Moisissure

Facteurs déterminants des grades de maïs	Grade	Poids spécifique minimum par boisseau Winchester (livres)	Limites maximales		
			Grains endommagés		Maïs fendillés et matières étrangères (pourcentage)
			Échauffés (inclus dans le total) (pourcentage)	Total (pourcentage)	
<b>US N° 1</b>	<b>56,0</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>US N° 2</b>	<b>54,0</b>	<b>0,2</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	
<b>US N° 3</b>	<b>52,0</b>	<b>0,5</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	
<b>US N° 4</b>	<b>49,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>US N° 5</b>	<b>46,0</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b>	<b>7,0</b>	



Saletés (pas endommagés)



Échauffement (au séchoir)



Échauffement (maïs jaune)



Endommagement du germe



Germination



Dommages provoqués  
par les insectes