

大麦



胴枯れ病による損傷



カビによる損傷



霜による損傷



霜害




胚の損傷



熱による損傷

等級要件	ーの下限		ーの上限				
	ブッシェル に対するの 最低容積重 (ポンド)	正常 大麦 (パーセント)	損傷した 穀粒 (パーセント)	熱で 損傷した 穀粒 (パーセント)	異物 (パーセント)	破損した 穀粒 (パーセント)	細麦 (パーセント)
U.S. No. 1	47.0	97.0	2.0	0.2	1.0	4.0	10.0
U.S. No. 2	45.0	94.0	4.0	0.3	2.0	8.0	15.0
U.S. No. 3	43.0	90.0	6.0	0.5	3.0	12.0	25.0
U.S. No. 4	40.0	85.0	8.0	1.0	4.0	18.0	35.0
U.S. No. 5	36.0	75.0	10.0	3.0	5.0	28.0	75.0



熱ダメージ



害虫による損傷



カビによる損傷



芽の損傷



皮がはがれた/破損



2条/6条

トウモロコシ



青い目のようなカビの損傷



むらさき色の幼芽




表面のかび(明るい色)



穂軸の腐食による損傷



表面のカビによる損傷



カビによる損傷

等級要件	ブッシェル に対しての 最低容積重 (パウンド)	の上限		
		損傷した穀粒		破損した トウモロコシと 異物 (パーセント)
		熱 (パーセント)	合計 (パーセント)	
U.S. No. 1	56.0	0.1	3.0	2.0
U.S. No. 2	54.0	0.2	5.0	3.0
U.S. No. 3	52.0	0.5	7.0	4.0
U.S. No. 4	49.0	1.0	10.0	5.0
U.S. No. 5	46.0	3.0	15.0	7.0



汚れ(破損ではない)



熱による損傷(乾燥機)



熱による損傷
イエローコーン



胚の損傷




芽の損傷




害虫による損傷

ソルガム



胚の損傷(脱色した)



地盤/気候による損傷



熱による損傷



害虫による損傷




カビによる損傷(表面)



カビによる損傷内部

等級要件	ブッシェル に対しての 最低容積重 (パウンド)	の上限			
		損傷した穀粒		破損した穀粒と異物	
		熱 (パーセント)	合計 (パーセント)	異物 (パーセント)	合計 (パーセント)
U.S. No. 1	57.0	0.2	2.0	1.0	3.0
U.S. No. 2	55.0	0.5	5.0	2.0	6.0
U.S. No. 3	53.0	1.0	10.0	3.0	8.0
U.S. No. 4	51.0	3.0	15.0	4.0	10.0



芽の損傷




分割した胚芽
(破損ではない)



紫色の色素



タンニンソルガム



ホワイトソルガム



非穀物ソルガム